

CANCERS DE LA THYROÏDE

Découverte histologique fortuite

MICROQOL (Reprise par le DEBDS- Contacter M. SCHIAPPA 1679 ou M. DEVIC 1511)

Patients atteints de microcarcinomes papillaires thyroïdiens de découverte histologique fortuite : qualité de vie et impact psychologique après chirurgie

Cohorte cas

Adjuvant

INTERMEDIATE

Essai multicentrique de phase III comparant 2 stratégies chez des patients présentant un cancer différencié de la thyroïde et un risque intermédiaire de maladie résiduelle post-opératoire : Traitement à l'I131 systématique (3.7GBq sous rhTSH) versus décision de traitement à l'I131 guidée par le taux sérique de Thyroglobuline (Tg) post-opératoire et une scintigraphie diagnostic à l'I131.

Réfractaire Métastatique

LENVOS

Etude de phase II, prospective, multicentrique évaluant l'efficacité du LENVatinib associé au denosumab dans le traitement des patients présentant un carcinome différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif avec métastases OSseuses prédominantes

MEGAMOST

Etude multicentrique de phase II, menée en ouvert, guidée par la biologie, évaluant l'activité de thérapies ciblant les altérations/caractéristiques moléculaires de tumeurs de stade avancé ou métastatique.