

CHIRURGIE DU SEIN

PRETORIA

Evaluation PROspective d'un test prEdictif de TOxicité post Radiothérapie après mastectomie avec reconstruction immédiate par ImplAnt

Cancer du sein avec indication de mastectomie (sauf T4) avec RMI par implant en 1 ou 2 temps puis radiothérapie de paroi

RPOS 2+

Radiothérapie per-opératoire (RPO) par Papillon =TM dans le cancer du sein localisé : Etude de faisabilité-toxicité

Adénocarcinome canalaire invasif, T ≤ 2cm, N0, grade 1 ou 2, unifocal, HER 2-, RH +, Age ≥ 65 ans, éligible à une chirurgie conservatrice

NEOVAB

Étude pilote prospective multicentrique visant à évaluer la précision de la biopsie percutanée par biopsie assistée par le vide (VAB) afin d'évaluer la réponse pathologique complète chez les patients présentant une réponse complète clinique et radiologique après une chimiothérapie néoadjuvante

Cancer du sein T1c, T2-3, N0-N+, triple négative ou HER 2+, ayant reçu au moins 6 cycles de CTNA, en réponse complète après CTNA, éligible à une chirurgie conservatrice

CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE

OVAmiRAN

Evaluation des miARN salivaires devant une masse annexielle d'origine ovarienne.